

Euthanasie vooral bij mannen met kanker

De voorbije jaren kregen meestal jongere, mannelijke kankerpatiënten euthanasie. Ze stierven ook vaker thuis. Dat blijkt uit een studie van Tinne Smets en haar collega's van de onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde van de VUB.

Enkele maanden geleden maakte de onderzoeksgroep al bekend dat het aantal euthanasiegevallen in ons land over de jaren is toegenomen sinds de invoering van de euthanasiewet in 2002.

In een nieuwe studie gingen ze na nu wat het profiel is van de mensen die in die periode euthanasie hebben gevraagd en gekregen. Ze onderzochten alle 1.917 euthanasiegevallen gerapporteerd tussen september 2002 en eind 2007. De overgrote meerderheid daarvan (83,1%) gebeurde in Vlaanderen, zo blijkt.

De meeste patiënten waren terminaal ziek (93,4%); de overige 6,6% waren niet-terminale patiënten met voornamelijk neuromusculaire ziekten. Hun aandeel is in de loop van de jaren niet toegenomen, stellen de onderzoekers vast. Ook het aandeel ouderen is niet significant gestegen: 18% van de bestudeerde gevallen betrof mensen ouder dan 80.

Duidelijk profiel

Van de terminaal zieke patiënten leed de meerderheid aan kanker. Volgens hun arts gaven zij meestal aan fysiek ondraaglijk te lijden, terwijl bij de niet-terminale patiënten vaker psychologisch lijden aangehaald werd.

Uit de cijfers tekent zich duidelijk een profiel af van de mensen die de voorbije jaren euthanasie kregen. In vergelijking met alle overlijdens zijn ze meestal jonger, van het mannelijke geslacht, leden ze aan kanker en stierven ze vaker thuis.

De euthanasie gebeurde meestal door toediening van barbituraten in combinatie met spierverslappers, en zelden uitsluitend met morfine.

V.C